



ИНСУЛЬТ



ЧМТ



ДЕМЕНЦИЯ

## Препарат Церебролизин® в клинических рекомендациях обществ Европейской Академии Неврологии (EAN) и Европейской Федерации по Нейрореабилитации (EFNR)

Beghi E. et al. Клинические рекомендации обществ Европейской академии неврологии и Европейской федерации специалистов в области нейрореабилитации относительно медикаментозной поддержки при ранней двигательной реабилитации после острого ишемического инсульта / European Journal of Neurology, 2021; 28:2831–2845.

- Высокие уровни достоверности доказательств и убедительности рекомендаций
- Убедительные результаты по ряду основных показателей
- Благоприятный профиль безопасности

**Церебролизин®**  
ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ. БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ.

# Первые клинические рекомендации EAN/EFNR по нейрореабилитации пациентов после инсульта

Получено: 3 апреля 2021 г. | Принято в печать: 17 мая 2021 г.

DOI: 10.1111/ene.14936

European Journal  
of Neurology  
the official journal of the European Academy of Neurology

## КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**Клинические рекомендации обществ Европейской академии неврологии и Европейской федерации специалистов в области нейрореабилитации относительно медикаментозной поддержки при ранней двигательной реабилитации после острого ишемического инсульта**

Ettore Beghi<sup>1</sup> | Heinrich Binder<sup>2</sup> | Codruta Birle<sup>3</sup> | Natan Bornstein<sup>4</sup> | Karin Diserens<sup>5</sup> | Stanislav Groppa<sup>6</sup> | Volker Homberg<sup>7</sup> | Vitalie Lisnic<sup>8</sup> | Maura Pugliatti<sup>9</sup> | Gary Randall<sup>10</sup> | Leopold Saltuari<sup>11</sup> | Stefan Strliciu<sup>12</sup> | Johannes Vester<sup>13</sup>



Целью данных клинических рекомендаций, основанных на доказательных данных, является поддержка процесса принятия **клинических решений** медицинскими специалистами, занимающимися восстановлением пациентов после инсульта.

Систематический обзор был выполнен в соответствии с рекомендациями, изложенными в методическом пособии «Предпочтительные параметры отчетности для систематических обзоров и мета-анализов» (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, **PRISMA**) и **Кокрейновском руководстве** по систематическим обзорам для медицинских процедур. Проект рекомендаций подготовлен с использованием принципов **GRADE**.

**Церебролизин®**  
(30 мл/сутки внутривенно, не менее 10 дней)  
**рекомендован для клинического применения**  
на ранних этапах нейрореабилитации  
после острого ишемического инсульта.



**Европейская академия неврологии (EAN)** – крупнейшее общество врачей-неврологов в мире, насчитывающее 45 000 экспертов

Доступно по адресу: <https://www.ean.org/home/about-us/who-we-are>. Дата обращения 05.03.2022

# Применение **Церебролизина** у пациентов после инсульта.

## Основные аргументы в пользу его выбора



**Высокие уровни  
достоверности доказательств  
и убедительности  
рекомендаций**

Результаты исследований CARS, ECOMPASS и мета-анализа Bornstein в клинических рекомендациях EAN признаны доказательствами высокого качества



**Убедительные  
результаты  
по ряду основных  
показателей**

Отмечается благоприятное действие препарата **Церебролизин®** на показатели неврологического дефицита (по шкале NIHSS), функционального исхода (по шкале mRS) и моторной функции (Early Motor Performance и ARAT)



**Благоприятный  
профиль безопасности**

Не выявлено различий между контрольной группой и группой препарата **Церебролизин®** по частоте развития и характеру СНЯ (серьезных нежелательных явлений)

“

**Доказательная база признана достаточной** для того, чтобы **рекомендовать применение препарата Церебролизин®** в умеренных и тяжелых случаях в качестве дополнения **к стандартной реабилитации в течение первых семи дней после начала острого ишемического инсульта**

”

# Рекомендованная схема применения препарата **Церебролизин®**



## Рекомендации по режиму дозирования

| Заболевание                         | Суточная доза | Начало лечения          | Продолжительность лечения |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| Ишемический инсульт (острый период) | 30 мл         | В течение первых 7 дней | Минимум 10 дней           |



**Название:** Клинические рекомендации обществ Европейской академии неврологии и Европейской федерации специалистов в области нейрореабилитации относительно медикаментозной поддержки при ранней двигательной реабилитации после острого ишемического инсульта  
<https://doi.org/10.1111/ene.14936>

**Авторы:** Beghi E., et al. Eur J Neurol. 2021 Sep; 28(9):2831–2845

**Сокращенная информация по применению лекарственного препарата Церебролизин®.** Регистрационный номер: П N013827/01; торговое наименование препарата: Церебролизин®; лекарственная форма: раствор для инъекций; состав: 1 мл раствора содержит: действующее вещество: Церебролизин® концентрат (комплекс пептидов, полученных из головного мозга свиньи) 215,2 мг; вспомогательные вещества: натрия гидроксид, вода для инъекций; показания к применению: болезнь Альцгеймера; синдром когнитивных нарушений различного генеза, включая деменцию; хроническая цереброваскулярная недостаточность (хроническая ишемия мозга, дисциркуляторная энцефалопатия); ишемический инсульт; черепно-мозговая травма; задержка умственного развития у детей; гиперактивность и дефицит внимания у детей; в комплексной терапии – при эндогенной депрессии, резистентной к антидепрессантам; способ применения и дозы: применяют в виде инъекций: внутримышечно (до 5 мл) и внутривенно (до 10 мл). Дозы от 10 мл до 50 мл рекомендуется вводить только посредством медленных внутривенных инфузий; дозы и продолжительность лечения зависят от характера и тяжести заболевания, а также от возраста больного (подробнее см. в инструкции по медицинскому применению); противопоказания: индивидуальная непереносимость препарата; тяжелая почечная недостаточность; эпилептический статус; с осторожностью: применяют препарат при аллергических диатезах, заболеваниях эпилептического характера, в том числе при генерализованной эпилепсии; побочное действие: редко: слишком быстрое введение препарата может привести к головокружению; очень редко: покраснение, зуд, жжение в месте введения (полный перечень побочных реакций приведен в инструкции по медицинскому применению); условия отпуска: отпускают по рецепту; наименование держателя регистрационного удостоверения: ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ, Обербургау 3, 4866 Унтерзах ам Аттерзее, Австрия; организация, принимающая претензии потребителей: ООО «ЭВЕР Нейро Фарма»: 107061, Россия, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8; тел.: +7 (495) 933-87-02; DrugSafety.ru@everpharma.com.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата Церебролизин®.



ООО «ЭВЕР Нейро Фарма»  
107061, Москва, Преображенская площадь, д. 8  
Тел.: +7 (495) 933-87-02  
[info.ru@everpharma.com](mailto:info.ru@everpharma.com)  
[www.everpharma.ru](http://www.everpharma.ru)